

什麼是半身麻醉

半身麻醉依照麻醉藥注入的地方，可分為脊髓麻醉或硬脊髓膜外麻醉。半身麻醉是將麻醉藥注入脊髓腔內或是硬腦膜外，暫時阻斷下半身脊髓神經的作用，達到麻醉的效果。在手術當中您是保持清醒的，但原則上為了減低您的緊張與壓力，會給您一些靜脈鎮定藥物，這時您會感到身心較放鬆、比較不緊張或是睡著。

半身麻醉後可能會出現的症狀

- 頭痛：典型的症狀是坐起來會嚴重的頭痛，但躺下後狀況會改善，通常頭痛是在術後一至二天內發生，在年輕人、女性或用較粗的麻醉針穿刺後發生的比例較高。臥床休息、補充輸液及服用止痛劑之後，一般都能很快好轉。
- 背痛：根據研究半身麻醉後的背痛發生率與全身麻醉相同，而且絕大部分可自癒。一般常聽到孕婦提到半身麻醉之後是否較容易腰酸背痛的疑問，其實是因為隨著孕期的進行，在腹部有胎兒及相關的重量，導致脊椎必須以與平常不同的彎曲弧度及姿勢來保持全身的重量平衡。因此在懷孕後期就容易有腰酸背痛的狀況開始出現。這是生理改變造成的背痛，與半身麻醉較無關聯。

From:

<http://wiki.mmh.tw/> - MMH Anesthesia Wiki

Permanent link:

<http://wiki.mmh.tw/doku.php/public:regional>

Last update: **2014-01-11 15:17**

